Nov. 78.

Atlas

zu den

Abhandlungen

der

Königlich Preussischen

Geologischen Landesanstalt.

Neue Folge. Heft 18.

Berlin.

In Vertrieb bei der Königlichen Geologischen Landesanstalt und Bergakademie, N. 4, Invalidenstrasse 44.

1903.

Househitten 1 On Con TOTAL PROPERTY PROPERTY OF THE nicohom] 0 7582 N,

17


-14

1.4



Wpisano do inwentarza
ZAKŁADU GEOLOGII
Dział B Nr. 462

Dnia 20 11 19 41



Atlas

zu den

Abhandlungen

der

Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt.



Neue Folge. Heft 18.

BERLIN.

In Vertrieb bei der Königlichen Geologischen Landesanstalt und Bergakademie, N. 4, Invalidenstrasse 44.

1903.

a g g n n l b a s d d A



Atlas

von

vierzehn Tafeln

zu der Abhandlung:

Die

Wirbelthier-Fauna

des

Mosbacher Sandes.

I. Gattung Rhinoceros.

Von

H. Schroeder.



von

der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt.

BERLIN.

Allas

STORES PROPERTY

contamble of science

155e

Wirbelthier-Fauna

Mosbacher Sandes.

Corporation ocerns

H. Schroeden.



der Klufeljeb Preussigeben Seelagiseben Landenmeinte.

RISHRA

to bireriet for the Maintain to Magnetic Land and a real formattering M. d. Invalidation of the





Tafel I.

Fig. 1.	Rhinoceros etruscus Falc., Schädel von oben gesehen. 1/4. Mosbach. — Geologisches	
	Landesmuseum zu Berlin	S. 17
Fig. 1a.	Derselbe von rechts gesehen	S. 17
Fig. 2.	Rhinoceros etruscus FALC., Schädel von oben gesehen. Nach FALCONER, Pal. mem. II,	
	Pl. 26, Fig. 1 u. 2 copirt unter Vergrösserung auf 1/4	S. 19
Fig. 2a.	Derselbe von rechts gesehen	S. 19

Abhandld.Kgl.Preuss.geol.Landesanst.NeueFolge,Heft XVIII.

Taf. I.





ould deshibe

Fig. 1. Phono on Provided Line, Solidated was links of a Copic ands shown at the last of the last of the state of the stat

on Westernan Strates, Man and 1875, 24 N. Mord

Tafel II.


Fig. 1.	Rhinoceros Mercki Jäg., Schädel von links. 1/4. Copie nach Brandt, Mém. d. l'Acad.	
	imp. de St. Pétersb. 24, Taf. I, Fig. 2. Irkutzk?	S. 12
Fig. 2.	Rhinoceros Mercki var. brachycephala, Schädel von links. 1/4. Copie nach H. v. MEYER,	
	Palaeontographica XI, Taf. XXXV. Daxlanden bei Karlsruhe	S. 131
Fig. 3.	Rhinoceros Mercki Jäg., Schädel von links. 1/4. Copie nach Rhinoceros leptorhinus OWEN	
	in Woodward, Geolog. Magaz. 1874, Pl. XV. Ilford	S. 12

H. Schröder. Säugethier-Fauna d. Mosbacher Sandes

I. Gattung Rhinoceros.


Abhandld Kgl. Preuss geol. Landesanst, Neue Folge, Heft XVIII

Taf. II.



W.Pütz gez.


Druck v. P. Bredel.




Tafel III.

Fig. 1.	Rhinoceros Mercki var. brachycephala, Schädel von unten gesehen. 1/4. Copie nach	
	H. von Meyer, Palaeontographica XI, Taf. XXXVI. Daxlanden bei Karlsruhe	S. 131
Fig. 1a.	Derselbe von hinten gesehen. Copie nach H. von Meyer, Palaeontographica XI,	
	Taf. XXXIX, Fig. 2, unter Reduction auf 1/4	S. 131
Fig. 2.	Rhinoceros Mercki Jäg., Schädel von unten. 1/4. Copie nach Brandt, Mém. de	
	l'Acad. imp. de St. Pétersbourg, 24, Taf. II, Fig. 1. Irkutzk	S. 131
Fig. 2a.	Derselbe von hinten gesehen. 1/4. Copie nach Brandt, Ibid., Taf. II, Fig. 2	S. 131
Fig. 3.	Rhinoceros etruscus FALC., Schädel von hinten gesehen. 1/4. Copie nach FALCONER,	
*	Pal. Mem. II, Taf. XXVII, Fig. 1	S. 34 u. 131

H. Schröder. Säugethier-Fauna d. Mosbacher Sandes I. Gattung Rhinoceros.





The lates of the Manual Articles of the Manua


Tafel IV.

Rhinoceros etruscus Falc., Oberkieferzahnreihen des Schädels Taf. I, Fig. 1, auf die Kaufläche gesehen. 3/4. Mosbach. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin S. 46 ff.

H. Schröder. Säugethier-Fauna d. Mosbacher Sandes I. Gattung Rhinoceros.


Abhandl.d.Kgl.Preuss.geol. Landesanst. Neue Folge, Heft XVIII.


Taf.IV.



Nic. Prillwitz gez.

Lichtdruck v. A. Frisch, Berlin.





Tafel V.

Fig. 1	Rhinoceros Mercki Jäg., Oberkieferzahnreihe auf die Kaufläche gesehen. 3/4. Eisenbahn-	
	einschnitt zwischen Jerxheim und Söllingen. Geologisches Institut zu Aachen S	5. 135
Fig. 2	Dieselbe von Innen gesehen	8. 135
	Bemerkung: Der p2 der linken Zahnreihe ist im Spiegelbilde in die hier abgebildete rechte	
	Zahnreihe eingefügt.	

H. Schröder. Säugethier-Fauna d. Mosbacher Sandes I. Gattung Rhinoceros.


Abhandl.d.Kgl.Preuss.geol.Landesanst. Neue Folge, Heft XVIII.

Taf.V.



Nic. Prillwitz gez.

Lichtdruck v.A.Frisch, Berlin.




Tafel VI.

Fig. 1.	Rhinoceros etruscus FALC., Rechte Oberkieferzahnreihe auf die Kaufläche gesehen. 3/4.	
	Mosbach. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin	S. 47 ff.
Fig. 2a.	Rhinoceros etruscus FALC., p2 des Oberkiefers von hinten gesehen. 1/1. Mosbach. —	
	Geologisches Landesmuseum zu Berlin	S. 47 u. 52
Fig. 2b.	Derselbe auf die Kaufläche gesehen	S. 47 u. 52
Fig. 2c.	Derselbe von innen gesehen	S. 47 u. 52
Fig. 2d.	Derselbe von aussen gesehen	S. 47 u. 52
Fig. 3.	Rhinoceros etruscus Falc., Aussenwand von m3 des Oberkiefers. 1/1. Mosbach. —	
	Geologisches Landesmuseum zu Berlin	S. 64
Fig. 4.	Rhinoceros Mercki Jäg., p ₁ des Oberkiefers von innen gesehen. ¹ / ₁ . Mosbach. Vergl.	
	Taf. VII, Fig. 1 u. 2. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin	S. 108
Fig. 5a.	Rhinoceros etruscus FALC., Keim des ersten Molaren des Oberkiefers von aussen	
	gesehen. $^{1}/_{1}$. Mosbach. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin	S. 59
Fig. 5b.	Derselbe von innen gesehen	S. 59
Fig. 5c.	Derselbe von hinten gesehen	S. 59


Abhandl.d.Kgl.Preuss.geol.Landesanst. Neue Folge, Heft XVIII.


Taf.VI.



Nic. Prillwitz n.W.Pütz gez.

Lichtdruck v. A. Frisch, Berlin.






Tafel VII.


Fig. 1.	Rhinoceros Mercki Jäg., p ₂ —m ₃ des Oberkiefers von aussen gesehen. ³ / ₄ . Mosbach. —
	Geologisches Landesmuseum zu Berlin
Fig. 2.	Dieselben auf die Kaufläche gesehen
Fig. 3a.	Rhinoceros Mercki JäG., m ₂ des Oberkiefers von hinten gesehen. ¹ / ₁ . Mosbach. —
	Geologisches Landesmuseum zu Berlin
Fig. 3b.	Derselbe auf die Kaufläche gesehen
Fig. 4.	? Rhinoceros etruscus Falo., m ₁ des Oberkiefers auf die Kaufläche gesehen. ¹ / ₁ . Mos-
	bach Geologisches Landesmuseum zu Berlin


Taf.VII.



Nic. Prillwitz gez.

Lichtdruck v. A. Frisch, Berlin.





Tafel VIII.


Fig. 1a. Rhinoceros etruscus FALC., Milchgebiss des rechten Oberkiefers von aussen gesehen. 3/4.	
Mosbach. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin	S. 37
Fig. 1b Dasselbe auf die Kaufläche gesehen	S. 37 u. 59
NB. Die eigenthümliche Zweitheilung des Stelidion an dem ersten Molaren entspricht nicht	
ganz dem jetzigen Zustande des Stückes, da die Präparation dieser Theile erst nach	
Fertigstellung der Zeichnung erfolgte. Vergl. den Text S. 59.	
Fig. 2. Rhinoceros etruscus FALC., Milchgebiss des linken Oberkiefers auf die Kaufläche ge-	
sehen. ³ / ₄ . Mosbach. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin	S. 37

H. Schröder. Säugethier-Fauna d. Mosbacher Sandes

I. Gattung Rhinoceros.


Abhandl.d.Kgl.Preuss.geol.Landesanst. Neue Folge, Heft XVIII.


Taf.VIII.



Nic. Prillwitz gez.

Lichtdruck v. A. Frisch, Berlin.






Tafel IX.

Fig.	1a.	Rhinoceros	Mercki	Jäg.,	Milchgebiss	des	linken	Obe	rkiefers	voi	aus	sen	ges	ehen	. 1	11.		
		Taub	ach. —	Univer	sitäts-Museu	m zu	Halle	a. S.									S. 1	134
Fig.	1b.	Dasselbe a	uf die B	Kaufläcl	ne gesehen .					٠						1	S.	134
Fig.	2a.	Rhinoceros	Mercki	Jäg., 1	m ₃ des Oberl	ciefer	s von i	nnen	gesehe	n. 1/	1. K	irch	berg	a. d	. Ja	xt.		
,					enkabinet zu													81
Fig.	2b.	Derselbe a	uf die E	Kaufläcl	ne gesehen .						130						S.	81

H. Schröder. Säugethier-Fauna d. Mosbacher Sandes I. Gattung Rhinoceros.


 $Abhandl.d.Kgl. Preuss. geol. \, Landes anst. \, Neue \, Folge, Heft \, \, \underline{XVIII}$


Taf. IX.



Nic. Prillwitz gez.

Lichtdruck v.A.Frisch, Berlin.






Tafel X.

Fig. 1a.	Rhinoceros etruscus Falc., Linke Oberkieferzahnreihe von innen gesehen. 3/4. Mosbach.			
	— Geologisches Landesmuseum zu Berlin	S. 49 ff		
Fig. 1b.	Dieselbe auf die Kaufläche gesehen	S. 49 ff		

H. Schröder. Säugethier-Fauna d. Mosbacher Sandes I. Gattung Rhinoceros.


Abhandl.d.Kgl.Preuss.geol.Landesanst. Neue Folge, Heft XVIII.


Taf. X.



gez.v.W.Pütz.

Lichtdruck v.A.Frisch, Berlin.





Tafel XI.

Fig. 1.	Rhinoceros etruscus Falc., Bruchstück des linken Unterkieferastes mit p ₂ —m ₃ . ³ / ₄ . Mos-		
	bach. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin	S.	70 ff.
Fig. 2.	Rhinoceros etruscus Falc., Unterkiefer von links gesehen. 1/4. Mosbach. Vergl. Taf. XII,		
	Fig. 1. — Naturhistorisches Museum zu Mainz	S.	70 ff.
Fig. 3.	Rhinoceros Mercki Jäg., Unterkiefer von links gesehen. 1/4. Mosbach. Vergl. Taf. XII,		
	Fig. 2. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin	S. 11	18


 $Abhandl.\,d.\,Kgl.\,Preuss.\,geol.\,Landesanstalt.\ \ Neue\,Folge,\,Heft\,XVIII.$

Taf. XI.



W. Pütz gez·

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W.



.

Tafel XII.

Fig. 1.	Rhinoceros etruscus Falc., Unterkiefer von oben gesehen. 1/4. Mosbach. Vergl. Taf. XI,	
	Fig. 2. — Naturhistorisches Museum zu Mainz	S. 70 ff
Fig. 2.	Rhinoceros Mercki Jäg., Unterkiefer von oben gesehen. 1/4. Mosbach. Vergl. Taf. XI,	
	Fig. 3. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin	S. 118
Fig. 3.	Rhinoceros Mercki Jäg., Jugendlicher Unterkiefer mit Milchgebiss. 1/2. Mosbach. —	
	Museum Senckenbergianum zu Frankfurt a. M	S. 117


 ${\bf Abhandl.\,d.\,Kgl.\,Preuss.\,geol.\,Landesanstalt.\ \ Neue\,Folge,\,Heft\,XVIII.}$

Taf. XII.



W. Pütz gez.

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W.




Tafel XIII.

Fig. 1a. Rhinoceros Mercki Jäg., p3 des Oberkiefers von innen gesehen. 1/1. Mühlhausen. —	
Geologisches Institut zu Halle	S. 138
Fig. 1b. Derselbe von vorne gesehen	S. 138
Fig. 2a. Rhinoceros Mercki Jäg., p ₁ des Oberkiefers auf die Kaufläche gesehen. ¹ / ₁ . Mühlhausen.	
Fig. 2a. Rhinoceros Mercki Jag., pi des Oberkieles auf die Radiaene geseine.	S. 140
- Geologisches Institut zu Halle	0 140
Fig. 2b. Derselbe von innen gesehen	5. 140
Fig. 3. Rhinoceros Mercki Jäg., p2 des Oberkiefers von innen gesehen. 1/1. Taubach. —	
Geologisches Institut zu Halle	S. 139
Fig. 4a. Rhinoceros cf. etruscus Falc., Nasenbein von unten gesehen. 1/3. Mosbach. — Geolo-	
gisches Landesmuseum zu Berlin	S. 23
Fig. 4b. Derselbe von oben gesehen	S. 23
Fig. 5. Rhinoceros etruscus Falc., Schädel von vorne gesehen. 1/3. Vergl. Taf. I, Fig. 1. —	
Geologisches Landesmuseum zu Berlin	S. 23


 $Abhandl.\,d.\,Kgl.\,Preuss.\,geol.\,Landesanstalt.\ \ Neue\,Folge, Heft\,XVIII.$


Taf. XIII.



W. Pütz gez.

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W.






Tafel XIV.

Fig. 1a.	Rhinoceros Mercki Jäg., m ₂ des Oberkiefers auf die Kaufläche gesehen. ¹ / ₁ . Weimar. —	
	Geologisches Landesmuseum zu Berlin	S. 129
Fig. 1b.	Derselbe von innen gesehen	S. 129
Fig. 2.	Rhinoceros etruscus Falc., m3 des Oberkiefers von hinten gesehen. 1/1. (Vergl. Taf. X.)	
	Mosbach. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin	S. 64
Fig. 3.	Rhinoceros Mercki Jäg., Keim eines m2 des Oberkiefers von innen gesehen. 1/1. Weimar.	
	— Geologisches Institut zu Halle	S. 129
Fig. 4.	Rhinoceros Mercki Jäg., m3 des Oberkiefers von hinten gesehen. 1/1. Weimar. — Geo-	
	logisches Institut zu Halle	S. 129
Fig. 5.	Rhinoceros Mercki Jäg., m3 des Oberkiefers von hinten gesehen. 1/1. Taubach. — Geo-	
	logisches Institut zu Halle	S· 129
Fig. 6.	Rhinoceros Mercki Jäg., m3 des Oberkiefers von hinten gesehen. 1/1. Taubach. — Geo-	
	logisches Institut zu Halle	S. 129

 $Abhandl.d.\,Kgl.\,Preuss.\,geol.\,Landesanstalt.\ \ Neue\,Folge, Heft\,XVIII.$


Taf. XIV.




W. Pütz gez.

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W.







BIBLIOTEKA KATEDRY NAUK O ZIEMI Politechniki Gdańskiej

Buchdruckerei A. W. Schade in Berlin N., Schulzendorfer Strasse 26.